



El Huerto



Número 122

Líderes en el Negocio Agroalimentario

TRATAMIENTO OLIVO MES DE JUNIO

Nos encontramos en fechas de proceder a la colocación de trampas de captura masiva de la mosca del olivo (*Bactrocera oleae*), con la finalidad de reducir las poblaciones e intentar paliar, en la medida de lo posible, los importantes daños que causa esta plaga sobre el olivar.

MOSCA DEL OLIVO (*BACTROCERA OLEAE*)

Consideramos muy interesante el establecimiento de una red de trampeo masivo en las parcelas de olivo, como complemento de otras medidas de control que se lleven a cabo con posterioridad, durante la campaña.



El llamado “mosquero Olike”, consiste en una botella transparente de 1,5 – 2 litros en la que se practican 4 agujeros (opuestos 2 a 2 y situados en el tercio superior de la botella) de 1 cm. de diámetro y que el agricultor puede conseguir fácilmente con bajo coste. Los mosqueros se rellenan hasta unos 4 cm. por debajo de los agujeros, con una disolución en agua de fosfato biamónico al 4%.



Los mosqueros se cuelgan a una altura aproximada de 1,5 m. en el interior del árbol, de forma que estén sombreados para retrasar la evaporación del líquido. Sólo hay que rellenarlos con agua cuando se observe la evaporación y si han capturado muchos insectos, o a mitad de campaña, renovar completamente el atrayente. Hay que evitar siempre que el atrayente caiga al suelo puesto que las moscas irían a éste y entrarían menos en el mosquero.

El Huerto

La densidad de mosqueros a colocar es de 100 por hectárea distribuidos de manera homogénea en toda la parcela, siendo la primera quincena del mes de junio el momento óptimo para su colocación, ya que a partir de la fase de endurecimiento del hueso la aceituna es susceptible de ser picada. Los mosqueros se mantendrán hasta la recolección, siendo también muy interesante dejar un remanente de 10 mosqueros por hectárea para la captura de las poblaciones invernales que están presentes durante esos meses a veces en un número elevado.