

# El Huerto



Número: 176

Líderes en el Negocio Agroalimentario

## OÍDIO EN PIMIENTO

La oidiopsis, ceniza o polvillo del pimiento es producida por el hongo *Leveillula taurica*, que se corresponde con la forma asexual de *Oidiopsis* spp. Es una enfermedad muy extendida en pimiento en los últimos años y de fácil diagnóstico. Es típica de climas cálidos, ya sean húmedos o secos. Sus condiciones óptimas de desarrollo son de 20 a 30°C y 70-80% de humedad relativa.

Esta enfermedad fúngica se muestra fundamentalmente en las hojas. Se manifiesta en el haz con decoloraciones circulares amarillentas, que debido a la necrosis posterior adquieren un color pardusco.

En el envés se desarrolla un punteado necrótico, muchas veces cubierto de moho blanco pulverulento. Los primeros síntomas aparecen en las hojas más viejas y a medida que avanza la enfermedad los síntomas aparecen en las hojas más nuevas, que se defolian pudiendo parar el desarrollo de la planta y frutos.



El azufre en espolvoreo o en pulverización puede ser utilizado como tratamiento preventivo. Es necesario procurar no utilizarlo con temperaturas altas, para evitar quemaduras foliares. Algunos métodos culturales como la elección de la época de trasplante, el deshoje de hojas viejas y su eliminación posterior del campo pueden ayudar a disminuir la incidencia de la enfermedad.

# El Huerto

Una vez instalada la enfermedad no queda más remedio que recurrir a productos sistémicos para frenar la incidencia de la misma. Es recomendable alternar las materias activas para evitar el desarrollo de cepas del hongo resistentes a las mismas.

Algunos de los productos autorizados son los siguientes:

<b>Materia activa</b>	<b>Nombre comercial</b>	<b>Dosis</b>	<b>P.S. (días)</b>
Azufre 72%	Heliosufre	0,2-0,6%	NP
Azufre coloidal 80%	Lainzufre	0,2-0,5%	3
Azoxistrobin 25%	Ortiva	80-100 cc/HL	3
Boscalida 26,7%+Piraclostrobin 6,7%	Signum	0,1-0,15%	3
Miclobutanil 24%	Sythane forte	0,02-0,04%	3
Ciproconazol 10%	Atemi 10	0,01-0,02%	3
Bupirimato 25%	Nimrod	0,2-0,3%	3
Penconazol 10%	Dorado P, Topas 10EC	0,03-0,04%	3
Trifloxistrobin 50%	Flint	0,025%	1
Kresoxim-Metil 50%	Stroby, Discus	0,02-0,05%	3
Matrafenona 50%	Vivando	0,03%	3
Fluopiram 25%+ Triadimenol 25%	Luna Devotion	0,03-0,04%	3
Ciflufenamid 1,5%+ Difenconazol 12,5%	Cidely Top	0,10%	3